

## LABORATORIO DEL SANATORIO V. FRANCHIN

### **12- ACIDO HIDROXINDOLACETICO EN ORINA DE 24 HS.**

Durante los 2 (dos) días previos a la recolección de la orina evitar absolutamente la ingesta de: Banana, tomate, chocolate, mani, ciruela, ananá, golosinas, té, café, mate, mate cocido, gaseosa ó cualquier otro alimento que contenga vainilla

Deberá interrumpir o no comenzar (previa consulta con el medico), toda medicación que contenga ácido acetil salicilico, como paracetamol y jarabe para la tos que contengan guaifenesina.

Realizar la menor cantidad de actividad física posible.

Al 3º (tercer) día, continuando con la dieta, recolectar orina de 24 hs. en un recipiente de vidrio bien lavado, enjuagado varias veces con agua y escurrido, al que se le agregará un conservante que se entrega en el Laboratorio (10 ml. de ácido clorhídrico). Comenzará a recolectarse a partir de la segunda orina del día, incluyendo **todo** el volumen de todas las micciones de ese día (en caso de levantarse de noche también se incluirán esas muestras) mas la primera orina del día siguiente. En caso que un recipiente no sea suficiente, trasvasar parte del liquido de dicho envase a un segundo envase para que ambos envases tengan conservante

Remitir al laboratorio toda la orina emitida en el horario de 7:00 a 10:30 hs.